

台灣每年皆有兒童 因 RSV 相關疾病死亡的案例



新生兒有這些症狀，快送醫！



奶量降低



嗜睡



活動力下降



躁動不安



呼吸急促

RSV 初期與一般的感冒相似

常見症狀包括：**鼻塞、流鼻水及咳嗽**

嬰兒時期感染 RSV 別輕忽感染與重症風險



9成 寶寶在 **2歲前**
都曾感染 RSV
感染後也**不會**獲得終生免疫

嚴重可能住院

嬰兒一旦感染 RSV
會增加**4倍**氣喘風險



寶寶即使沒出門 也要小心 RSV ！

RSV 病毒可停留於物體表面長達 24 小時
日常接觸需多留意！



家中有就學兄弟姐妹



長期暴露於二手菸環境

(含孕期吸菸)



在月子中心/托嬰中心接受照護



有過敏與氣喘家族史

目前沒有專門治療 RSV 感染的藥物

日常生活中，我們可以這樣保護寶寶



勤洗手



減少群聚



創造無菸環境



預防勝於治療，避免 RSV 帶來的後遺症
寶寶可接種 RSV 單株抗體

給寶寶配置 **RSV 專屬保鏢**

RSV 長效單株抗體，守護寶寶高風險的第一年！



給寶寶**最明確的 RSV 抗體**守護



快速見效

施打後無需等待
可以直接擁有保護力



明確保護

不受免疫系統
發育程度或早產影響



目前**沒有**寶寶可以打的 RSV 疫苗喔！



RSV 抗體 及早守護

孕婦時期打疫苗，母體抗體在寶寶出生後 3 個月起會快速下降，
可在寶寶 3 個月時加一劑 RSV 抗體，加強防護力

有以下情境，更需留意 RSV 風險



家中有就學
兄弟姐妹



長期暴露於
二手菸環境



在月子中心/托嬰
中心接受照護



有過敏與氣喘
家族史

防堵 RSV，**一歲前**是關鍵！

出生起任何月齡皆可接種 RSV 抗體，
快向兒科醫師諮詢吧～



1歲前的 RSV 專屬保鏢

寶寶 RSV 抗體



RSV 抗體直送！

〈即刻保護〉

打了就能保護！

〈直接保護〉

免疫系統尚在發育的
新生兒也能直接使用

〈長效保護〉

接種一劑 RSV 長效型抗體
可保護最脆弱的第一年

媽媽 RSV 抗體



媽媽透過胎盤傳給寶寶！

〈兩週醞釀〉

媽媽接種後需14天產生抗體

〈抗體代工〉

媽媽需具備完善的
免疫系統、胎盤功能

〈初始保護〉

提供出生後至 3-6個月左右的
初始抗體防護